


TD1 : Ondes

Exercice 1 : ONDE PROGRESSIVE LE LONG D'UNE CORDE

On étudie la propagation sans amortissement d'une perturbation le long d'une corde élastique. Au temps $t = 0$, le front de l'onde quitte l'extrémité S de la corde. On trace ci-dessous la forme de la corde au temps $t_1 = 2,3$ s.



- Calculer la célérité c de l'onde qui se déplace le long de la corde.
- Pendant combien de temps un point de la corde est-il mis en mouvement par le passage de l'onde ?
- Au temps t_1 , quels sont les points qui s'élèvent ? Quels sont ceux qui descendent ?
- Représentez sur le graphique l'allure de la corde à $t_2 = 1$ s.
- Tracez l'évolution temporelle de la position de la corde au point Q ($x=12$ m).

Exercice 2 : ONDES SISMIQUES

Lors d'un tremblement de terre, deux types d'ondes sont générées, des ondes longitudinales (P), et des ondes transversales (S) qui se propagent avec des célérités différentes notées respectivement $c_p = 8,0 \text{ km s}^{-1}$ et $c_s = 4,5 \text{ km s}^{-1}$. Un sismographe qui enregistre ces ondes note que les premières ondes P arrivent 3 minutes avant les premières ondes S.

- À quelle distance l'épicentre du tremblement de Terre se trouve-t-il ?
- Comment pourrait-on localiser précisément l'épicentre ?


Exercice 3 : EFFET DOPPLER

L'effet Doppler correspond au décalage de la fréquence d'une onde lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement relatif. Une source sonore émet une onde sinusoïdale de célérité c à la fréquence f dans la direction x . Un observateur situé en M et animé d'une vitesse v suivant le même axe x reçoit le son.

- Écrire la fonction représentant l'onde émise par la source dans la direction des x croissants.
- Quelle est la position $x_M(t)$ de l'observateur au cours du temps ?
- Écrire la fonction qui représente l'onde reçue par l'observateur en mouvement.
- Que vaut la fréquence f' entendue par l'observateur en fonction de f , v et c ?
- Comment est modifiée le son que l'on perçoit lorsque l'on s'approche de sa source ? Que se passe-t-il si c'est la source sonore qui bouge ?

Exercice 4 : BULLE DE SAVON

Considérons une bulle de savon éclairée par une source S d'onde lumineuse monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ . La bulle est constituée d'un film d'eau d'épaisseur e . Une partie de la lumière incidente est réfléchiée à l'interface air-eau puis une seconde partie est réfléchiée à l'interface eau-air. Lors de sa réflexion sur l'interface air-eau, l'onde subit un déphasage supplémentaire de π .



- Expliquer pourquoi on observe un phénomène d'interférences en M .
- La célérité de la lumière dans l'eau vaut c/n_e où c est la célérité de la lumière dans le vide. Combien vaut la longueur d'onde λ_e dans l'eau en fonction de λ ? (La fréquence reste inchangée dans l'eau). Exprimer les nombres d'onde dans l'air (k_a) et dans l'eau (k_e) en fonction de λ et n_e .
- Montrer que les phases $\varphi_1(t)$ et $\varphi_2(t)$ des ondes se réfléchissant sur la première et la seconde interface sont données par :

$$\varphi_1(t) = k_a(2a + b) - \omega t + \pi$$


$$\varphi_2(t) = k_a(2a + b) + 2e k_e - \omega t$$

En déduire le déphasage $\Delta\varphi$ entre les deux ondes qui interfèrent en M .

- Pour quelles longueurs d'ondes (dans l'air) obtient-on des interférences constructives ? destructives ?
- A.N. : Pour $e = 0,25 \mu\text{m}$ et $n_e=1.4$, quelles sont les longueurs d'onde du spectre visibles pour lesquelles les interférences sont constructives ? destructives ? De quelle couleur apparaît la bulle ?
- Expliquez qualitativement pourquoi une bulle plus épaisse ($e > 1 \mu\text{m}$) apparaît blanche.

Exercice 5 : TROUS D'YOUNG

Une source lumineuse S émet une onde sinusoïdale de longueur d'onde λ d'équation $A \cos(\omega t - kl)$ (où l est la distance entre S et le point considéré) en direction d'un cache situé à une distance d percé de deux trous de petite taille espacés d'une distance a . On suppose que chacun des trous renvoie l'onde dans toutes les directions et notamment vers un écran situé à une distance D des trous. On suppose que $a \ll D$



- Pourquoi peut-on écrire que les ondes ré-émises par chacun des trous sont représentées par les fonctions $f_1(l_1, t) = A \cos(\omega t - kl_1 + \varphi)$ et $f_2(l_2, t) = A \cos(\omega t - kl_2 + \varphi)$? l_1 et l_2 représentent la distance entre le point considéré et les trous 1 et 2. Que représente φ et quelle est sa valeur ?
- Les ondes issues des deux trous produisent des interférences. Expliquer qualitativement pourquoi on observe ce phénomène, et comment il se manifeste dans le cas présent.
- Calculer le déphasage $\Delta\phi$ entre les ondes issues des deux trous arrivant au point M repéré par sa distance x à l'axe y (en supposant $x \ll D$). On rappelle que si $x \ll 1$ alors $\sqrt{1+x} \simeq 1 + x/2$.
- Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles les interférences sont constructives (en fonction de a, D et λ) ? destructives ? Qu'observe-t-on dans les deux cas ?
- Tracer l'allure de l'intensité lumineuse observée sur l'écran en fonction de x .
- Quel phénomène explique que chacun des trous ré-émette l'onde incidente dans toutes les directions ? Quelle doit être l'ordre de grandeur de la taille des trous ?

Exercice 6 : BATTEMENTS

On place au point O de l'axe x deux haut-parleurs émettant des sons à deux fréquences légèrement différentes f_1 et f_2 en direction d'une personne placée en $M(x_M)$ qui écoute.

- Écrire la fonction représentant l'onde émise par chacun des deux haut-parleurs sur l'axe x .
- Écrire la fonction représentant l'onde sonore reçue par la personne sous la forme d'un produit de deux fonctions trigonométriques.
- Pour des fréquences $f_1 = 2000 \text{ Hz}$ et $f_2 = 2001 \text{ Hz}$, décrire le son perçu par la personne qui écoute.
- Tracez l'allure de l'évolution temporelle de l'onde sonore perçue.

Exercice 7 : ÉPAISSEUR D'UN CHEVEU

On éclaire avec un laser rouge dont le faisceau a un diamètre d de longueur d'onde $\lambda = 633 \text{ nm}$ une fente de largeur $l \ll d$ et on observe l'éclairement d'un écran situé à une distance $D \gg l^2/\lambda$ de la fente.

- Faire un schéma du système décrit.
- Quelle sera la forme et les dimensions approximatives de la tache observée sur l'écran ?
- Si on note I l'intensité du faisceau incident (supposée homogène), quelle sera l'intensité moyenne I_e de la tache sur l'écran ?
- On suppose que la figure de diffraction produite par un cheveu d'épaisseur l à la même taille que celle produite par une fente de même largeur. Exprimer l'épaisseur l en fonction de la largeur L de la tache de diffraction.
- A.N. : Calculer l'épaisseur d'un cheveu produisant une tache de largeur $L = 2 \text{ cm}$ à une distance $D = 2 \text{ m}$